

1. Dwa-trzy dni przed badaniem **nie należy** spożywać: warzyw i owoców pestkowych (np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek, ogórków), siemienia lnianego, maku, pełnoziarnistego chleba.
2. W dniu przyjęcia do szpitala pacjent pozostaje na czczo do momentu pobrania krwi do badań. Po pobraniu krwi do badań można zjeść lekki posiłek bez mleka, surowych owoców i warzyw oraz napojów gazowanych. Inne napoje można pić w dowolnej ilości do godz.23.00.
3. W dniu przyjęcia **w Oddziale** od godziny 17-tej chory dostaje do picia roztwór Moviprepu 2 x 1 litr–wypić szklankę co 10-15 min. Rozpuszczać Miviprep w **letniej wodzie – nie gorącej !** W tym dniu należy **bezwzględnie** wypić dodatkowo ok.2 litrów klarownych innych płynów np.woda mineralna,herbata), aby zapobiec uczuciu pragnienia i odwodnieniu oraz dokładnie wyczyścić jelita.
Od rozpoczęcia picia roztworu Moviprepu nie należy przyjmować pokarmów stałych.
4. Przygotowanie roztworu: dodać zawartość saszetki A i B do naczynia i dolać 1 litr przegotowanej, schłodzonej wody lub wody mineralnej niegazowanej. Mieszać ok. 5 min do całkowitego rozpuszczenia proszku.
Po wypiciu przygotować druga dawkę w ten sam sposób.
5. Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.
6. **W dniu badania nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków (bez jedzenia i picia).**
7. **Osoby wymagające stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienie tętnicze, choroby serca, padaczka, astma) w dniu badania ok. godz. 5 rano powinny zażyć poranną dawkę leków, popijając niewielką ilością wody. Chorzy na cukrzyce nie zażywają porannej dawki tabletki lub insuliny!!!**
8. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. Acenokumarol, Sintrom,Warfin) powinny odstawić ten lek 5 dni przed badaniem i stosować heparynę drobnocząsteczkową (np. Clexane, Fraxiparyna) **po porozumieniu z lekarzem prowadzącym** . Osoby przyjmujące leki p/płytkowe (Plavix, Zyllt, Clopidix, Areplex) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem; w przypadku stosowania Xarelto,Pradaxa lek odstawić 2 dni przed badaniem **należy to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym !**
9. 2-3 tygodnie przed przyjęciem do Szpitala na kolonoskopię należy udać się do lekarza rodzinnego po zaświadczenie z wyszczególnieniem chorób leczonych w POZ oraz przepisywanych lekach. Pacjenci zdrowi też muszą posiadać takie zaświadczenie o nie stosowaniu żadnych leków na stałe. Pacjenci leczeni w poradniach specjalistycznych: endokrynologicznej, kardiologicznej, diabetologicznej, pulmonologicznej, neurologicznej i nefrologicznej muszą posiadać aktualne - 2-3 tygodnie przed przyjęciem do Szpitala - orzeczenie lekarskie z określeniem wydolności leczonego narządu.Pacjenci hospitalizowani w przeszłości powinni posiadać przy sobie karty informacyjne z pobytu w szpitalu oraz ewentualne wyniki poprzednich badań endoskopowych. W przypadku chorób tarczycy należy posiadać aktualne wyniki badań hormonów!
Są to niezbędne warunki do wykonania kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym !!!
10. Po badaniu obowiązuje 12-godzinny bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i picia alkoholu .

W GODZ. 10:00-11:00 ZGŁOSIĆ SIĘ NA PLANOWĄ IZBĘ PRZYJĘĆ W DNIU:

PROSIMY! O TELEFONICZNE ODWOŁANIE BADANIA

w przypadku braku możliwości zgłoszenia się w wyznaczonym terminie